

2011年度放射線影響調査の結果 調査期間(2011. 12. 1~2012. 3. 2)


県南内陸市町と沿岸宮古市在住132人(3~15歳)尿中放射性セシウム濃度を測定

※関連ホームページ: 岩手県放射線内部被ばく健康影響調査有識者会議


<http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=2500&of=1&ik=1&pnp=2500&cd=37569>

市町	平均値Bq/L	最大~最小Bq/L	不検出者数(測定者)	不検出の割合	宮古市と比較
一関市	2.63	5.96~ND	3(60)	5%	5.5倍
平泉町	3.48	6.76~1.76	0(12)	0%	7.3倍
奥州市	1.97	6.37~ND	2(36)	5.6%	4.1倍
金ヶ崎町	1.61	4.98~ND	2(12)	16.70%	3.4倍
宮古市	0.48	1.36~ND	6(12)	50%	1倍
全体	2.24	5.96~ND	13(132)	9.80%	


平泉町 尿中放射性セシウム濃度分布




奥州市 尿中放射性セシウム濃度分布




一関市 尿中放射性セシウム濃度分布



金ヶ崎町 尿中放射性セシウム濃度分布



宮古市 尿中放射性セシウム濃度分布



グラフの縦軸幅が各々違いますので注意して下さい。

「放射線被曝から子どもを守る会・いわて」が情報開示で得た資料を元に作成しました。

		番号	Bq/L	市町			番号	Bq/L	市町	
	67	59	1.93	一関市		100	53	1.28	一関市	
	68	57	1.92	一関市		101	90	1.27	金ヶ崎町	
	68	64	1.92	一関市		102	50	1.22	一関市	
	70	125	1.87	奥州市		103	132	1.2	奥州市	
	71	20	1.86	一関市		104	77	1.15	宮古市	
	72	105	1.83	奥州市		105	74	1.13	宮古市	
	72	117	1.83	奥州市		106	100	1.07	奥州市	
	74	26	1.76	平泉町		107	115	1.05	奥州市	
	75	127	1.73	奥州市		107	130	1.05	奥州市	
	76	54	1.7	一関市		109	48	1.04	一関市	
	76	67	1.7	一関市		110	107	1.03	奥州市	
	78	65	1.64	一関市		111	78	1.02	宮古市	
	78	93	1.64	金ヶ崎町		112	104	1.01	奥州市	
	80	68	1.59	一関市		113	128	0.78	奥州市	
	81	94	1.57	金ヶ崎町		114	73	0.76	宮古市	
	82	95	1.56	金ヶ崎町		114	101	0.76	奥州市	
	82	110	1.56	奥州市		114	113	0.76	奥州市	
	82	124	1.56	奥州市		117	83	0.34	宮古市	
	85	96	1.51	金ヶ崎町		118	122	0.33	奥州市	
	86	47	1.5	一関市		119	123	0.31	奥州市	
	87	98	1.49	奥州市		120	1	ND	一関市	
	88	39	1.47	一関市			15	ND	一関市	
	89	55	1.47	一関市			23	ND	一関市	
	90	8	1.45	一関市			75	ND	宮古市	
	91	2	1.43	一関市			76	ND	宮古市	
	92	38	1.39	一関市			79	ND	宮古市	
	93	80	1.36	宮古市			81	ND	宮古市	
	94	52	1.35	一関市			82	ND	宮古市	
	94	66	1.35	一関市			84	ND	宮古市	
	94	87	1.35	金ヶ崎町			86	ND	金ヶ崎町	
	94	92	1.35	金ヶ崎町			91	ND	金ヶ崎町	
	98	70	1.31	一関市			103	ND	奥州市	
	98	88	1.31	金ヶ崎町			121	ND	奥州市	