

低線量被ばくで発がん

05.7.1

米などの国際調査 高い危険性を指摘

【ワシントン30日共同】

〔吉本明美〕放射線被ばくは低線量でも発がんリスクがあり、職業上の被ばく線量限度である五年間で百ミリシーベルトでも約1%の人が放射線に起因するがんになるとの報告書を、米科学アカデミーが世界の最新データを基に三十日までにまとめた。報告書は「被ばくによるがんのリスクは、これ以下なら安全」と言える量はないと指摘。国際がん研究機関などが日本を含む十五カ国の原発作業員を対象にした調査でも、線量限度以内の低線量被ばくで、がん死の危険が高まることが判明した。

低線量被ばくの人体への影響をめぐっては、「一定量までなら害はない」との主張や「ごく低線量の被ばくは免疫を強め、健康のためになる」との説もあった。報告書はこれらの説を否定、低線量でも発がんリスクはあると結論づけた。業務や病気の診断や治療で放射線

を浴びる場合でも、被ばく量を低減する努力が求められそうだ。

米科学アカデミーは、従来被ばくの発がんリスクの調査に用いられてきた広島・長崎の被爆データに加え、医療目的で放射線照射を受けた患者のデータなどを総合し、低線量被ばくのリスクを見積もった。それによると、百ミリシーベルトで一年間に1人あたりに1回分に相当するとい

て100ミリシーベルトとされる。自然放射線と、エックス線検査など医療で浴びる放射線は含まれない。日本の商業原発で2002年度の1年間に作業員が浴びた線量の平均値は1・3ミリシーベルト、最も多く被ばくした作業員は19・7ミリシーベルトだった。原発や医療現場における放射線業務従事者は、1年間で50ミリシーベルト、5年間

従来より高リスク

草間朋子・大分県立看護科学大学長（放射線防護）の話 原発作業員の調査は、低線量の放射線を対象にした初の大規模な調査だ。低線量でも影響があること、さらに、瞬間に被ばくした広

島、長崎での調査を基にした従来の評価より高いリスクを示していることは興味深い。カナダなど一部の国の大データに引張られて高くなつた可能性があるが、低線量では人体に影響がないと言張るのは難しくなつたのではないか。

う。また、百ミリシーベルト以下でもリスクはあると指摘。十ミリシーベルトの被ばくになると全身のエックス線CTを受けた広島・長崎の被爆データの結果が、千人に一人はがんになる、とした。また、国際がん研究機関などが約四十万七千人の原発作業員を長期追跡した調査では、被ばく線量の危険が約10%上昇する結果が出た。調査対象の平均累積被ばく線量だった約十九ミリシーベルト程度でも、がんの死亡率がわずかに高まる可能性が示された。

島、長崎での調査を基にした従来の評価より高いリスクを示していることは興味深い。カナダなど一部の国の大データに引張られて高くなつた可能性があるが、低線量では人体に影響がないと言張るのは難しくなつたのではないか。

島、長崎での調査を基にした従来の評価より高いリスクを示していることは興味深い。カナダなど一部の国の大データに引張られて高くなつた可能性があるが、低線量では人体に影響がないと言張るのは難しくなつたのではないか。

島、長崎での調査を基にした従来の評価より高いリスクを示していることは興味深い。カナダなど一部の国の大データに引張られて高くなつた可能性があるが、低線量では人体に影響がないと言張るのは難しくなつたのではないか。